\Box

京都大学医学部附属病院 薬剤部 御中

報告日: 年 月

服薬情報提供書(トレーシングレポート)【タルセバ錠】

担当医			科		保険薬局 名称・所在地			
先生 御机下								
患者 ID:					TEL:	FAX:		
患者名:				担当薬剤師名:		印		
上記治療薬に関する薬学的管理(副作用評価及び服薬指導)を行いました。 下記の通り、ご報告いたします。ご高配賜りますようお願い申し上げます。								
【服薬状況】 □ 継続服用できている □ しばしば服用できないことがある □ 休薬中 (<u>しばしば服用できないことがある</u> 、 <u>休薬中</u> に該当した場合) - 理由 □ 飲み忘れ □ 用法・用量の理解不足 □ 副作用の発現 (詳細は「症状の詳細・その他の症状」記載欄に記入) □ その他 (- 次回診察時に調節が必要な残薬 □なし □あり (詳細は「症状の詳細・その他の症状」記載欄に記入)								
【支持療法薬の使用状況】 □ 未使用 □ 指示通りに服用できている □ 指示通りの使用ができていない(詳細は「症状の詳細・その他の症状」記載欄に記入)								
【副作用の評価(※ 印にチェックがあり、 緊急を要する場合は電話での連絡 もお願いします)】 ・ 直近(受診日以外)における臓器機能の急激な悪化 □なし □ <u>あり(□腎機能障害、□肝機能障害)</u> ・ 発熱(38 度以上) □なし □ <u>あり</u> ・ 感染症様症状(喉の痛み、排尿時痛) □なし □ <u>あり</u> ・ 呼吸困難・息切れ・空咳 □なし <u>□あり</u>								
症状		Gradel			Grade2	Grade3 (※症状の詳細を下欄に記入)		
下痢	□なし		<4回/日の排便回数の増加		4-6 回/日の排便回数の増加; 身の回り以外の日常生活動作の制限		7 回以上/日の排便回数の増加; 便失禁;身の回りの日常生活動作の制限	
ざ瘡様皮疹	□なし		体表面積の<10%を占める紅色 丘疹および/または膿疱		体表面積の 10-30%を占める紅色丘疹および/ または膿疱;社会心理学的な影響を伴う; 身の回り以外の日常生活動作の制限		体表面積の>30%を占める紅色丘疹および/または膿疱;身の回りの日常生活動作の制限; 経口抗菌薬を要する局所の重複感染	
皮膚乾燥	□なし		体表面積の<10%を占めるが紅 斑やそう痒は伴わない		体表面積の 10-30%を占め、紅斑またはそう痒 を伴う;身の回り以外の日常生活動作の制限		体表面積の>30%を占め、そう痒を伴う; 身の回りの日常生活動作の制限	
爪囲炎	□なし		爪壁の浮腫や紅斑;角質の剥離		局所的処置を要する;内服治療を要する;疼痛を伴う爪壁の浮腫や紅斑;滲出液や爪の分離を伴う;身の回り以外の日常生活動作の制限		外科的処置や抗菌薬の静脈内投与を要する; 日常生活動作の制限	
口内炎	□なし		症状がない、または軽度の症状が ある;治療を要さない		中等度の疼痛; 経口摂取に支障がない;食事の変更を要する		高度の疼痛;経口摂取に支障がある	
<u>症状の詳細・その他の症状 等</u> : (CTCAE v4.0 JCOG を一部改変) 薬剤師としての提案事項・その他の報告事項								
采用師とし	(の従条	争力	号・てい他の 報古事垻					

改訂:2021/7/30