

自動車運転等危険を伴う作業について指導が必要な薬剤

この一覧は、添付文書上に自動車運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業について記載がある薬剤です。

添付文書上の記載内容を元に、患者の状態や併用薬、生活状況などを考慮の上、説明・指導を行ってください。

「警告」欄に記載のある医薬品 *画面上【禁運転】、院外処方せん上は【運転等制限】と記載

薬効分類	採用商品名	一般名	添付文書記載内容
1169	アポカイン皮下注30mg(3mL)	アポモルヒネ塩酸塩水和物	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがあるので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明すること。本剤投与中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	ビ・シプロール錠0.125mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突然の睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	ビ・シプロール錠0.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突然の睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	ミラベックスLA錠0.375mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがある、また突然の睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	ミラベックスLA錠1.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがある、また突然の睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがある、また突然の睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤貼付中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがある、また突然の睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤貼付中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがある、また突然の睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤貼付中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがある、また突然の睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤貼付中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがある、また突然の睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤貼付中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	ハルロピテープ16mg	ロピニロール塩酸塩	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがある、またドバミン受容体作動薬の投与において、突然の睡眠により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤使用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	ハルロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがある、またドバミン受容体作動薬の投与において、突然の睡眠により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤使用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	ハルロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがある、またドバミン受容体作動薬の投与において、突然の睡眠により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤使用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	ハルロピテープ40mg	ロピニロール塩酸塩	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがある、またドバミン受容体作動薬の投与において、突然の睡眠により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤使用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	ハルロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがある、またドバミン受容体作動薬の投与において、突然の睡眠により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤使用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがある、また突然の睡眠により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	レキップCR錠8mg	ロピニロール塩酸塩	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがある、また突然の睡眠により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」	ロピニロール塩酸塩	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがある、また突然の睡眠により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
1169	ロピニロールOD錠1mg「アメル」	ロピニロール塩酸塩	前兆のない突然の睡眠及び傾眠等がみられることがある、また突然の睡眠により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。

1169	ロピニロールOD錠2mg	ロピニロール塩酸塩	前兆のない突然の睡眠及び眠眼等がみられることがあり、また突然の睡眠により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突然の睡眠及び眠眼等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。
6179	ブイエンド200mg静注用	ポリコナゾール	羞明、霧視、視覚障害等の症状があらわれ、本剤投与中止後も症状が持続することがある。本剤投与中及び投与中止後もこれらの症状が回復するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
6179	ブイエンド錠50mg	ポリコナゾール	羞明、霧視、視覚障害等の症状があらわれ、本剤投与中止後も症状が持続することがある。本剤投与中及び投与中止後もこれらの症状が回復するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
6179	ポリコナゾール錠100mg「JG」	ポリコナゾール	羞明、霧視、視覚障害等の症状があらわれ、本剤投与中止後も症状が持続することがある。本剤投与中及び投与中止後もこれらの症状が回復するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。

「重要な基本的注意」欄に従事させないまたはそれに類する記載のある医薬品

薬効分類	採用商品名	一般名	添付文書記載内容
1123	トリクロールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。
1124	コンスタン0.4mg錠	アルブラゾラム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	ソラナックス0.8mg錠	アルブラゾラム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	ユーロジン2mg錠	エスタゾラム	本剤の投与により、その影響が翌朝以後に及ぶことがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	ドラール錠15	クアゼパム	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	セバジン錠1	クロキサゾラム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	セバジン錠2	クロキサゾラム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	2mgセルシン錠	ジアゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	5mgセルシン錠	ジアゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	セルシン散1%	ジアゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	グラナダキシン錠50(50mg)	トフィソパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	ハルシオン0.125mg錠	トリアゾラム	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	ベンザリン錠5	ニトラゼパム	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	フルニトラゼパム錠1mg「アメリカ」	フルニトラゼパム	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	フルニトラゼパム錠2mg「アメリカ」	フルニトラゼパム	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	ダルメートカブセル15	フルラゼパム塩酸塩	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	プロチゾラムOD錠0.25mg「サイ」	プロチゾラム	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	レキソタン錠2	プロマゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	レスミット錠5	メダゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	メイラックス錠1mg	ロフラゼブ酸エチル	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	メイラックス錠2mg	ロフラゼブ酸エチル	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1124	エバミール錠1.0	ロルメタゼパム	本剤の影響により、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1125	フェノバルル錠30mg	フェノバルビタール	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1125	フェノバルビタール散10%	フェノバルビタール	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1125	ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム	本剤投与中の患者には、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

薬効分類	採用商品名	一般名	添付文書記載内容
1129	エスゾピクロン錠1mg「トーワ」	エスゾピクロン	本剤の影響が翌朝以降に及び、眠気、注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1129	エスゾピクロン錠3mg「トーワ」	エスゾピクロン	本剤の影響が翌朝以降に及び、眠気、注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1129	ゾビクロン錠10mg	ゾビクロン	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1129	ゾビクロン錠7.5mg「トーワ」	ゾビクロン	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1129	ゾルビデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	ゾルビデム酒石酸塩	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力、集中力、反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1129	ゾルビデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルビデム酒石酸塩	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力、集中力、反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1129	セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩	眠気・めまい等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1129	リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1129	塩酸リルマザホン錠2mg	リルマザホン塩酸塩水和物	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1132	アレビアチン散10%	フェニトイ	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1132	アレビアチン錠100mg	フェニトイ	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1132	ヒダントール錠25mg	フェニトイ	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1135	ブリミドン細粒99.5%	ブリミドン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1135	ブリミドン錠250mg	ブリミドン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1137	オスボロット錠200mg	スルチアム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1139	エビレオブチマル散50%	エトスクシミド	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1139	ガバペン錠200mg	ガバベンチン	傾眠、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1139	テグレトール細粒50%	カルバマゼピン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1139	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1139	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1139	ランドセン細粒0.1%	クロナゼバム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1139	リボトリール錠0.5mg	クロナゼバム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1139	マイスタン錠5mg	クロバザム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1139	ディアコミットドライシロップ分包250mg	スチリペントール	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1139	エクセグラント散20%	ゾニサミド	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1139	エクセグラント錠100mg	ゾニサミド	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1139	トビナ細粒10%	トピラマート	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1139	トビナ錠25mg	トピラマート	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1139	トビナ錠50mg	トピラマート	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1139	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1139	デバケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1139	デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

薬効分類	採用商品名	一般名	添付文書記載内容
1139	デパケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1139	デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1139	デパケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1139	サブリル散分包500mg	ビガバトリン	本剤の投与により眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、代諾者に対し注意を与えること。また、患者に対し本剤投与中には危険を伴う機械操作や遊戲などを行わないよう十分に注意を与えること。
1139	ヒダントールF配合錠	フェニトイ・フェノバルビタール配合剤	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1139	フィコンバ錠2mg	ペランパネル水和物	めまい、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う操作に従事させないよう注意すること。
1139	フィコンバ錠4mg	ペランパネル水和物	めまい、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う操作に従事させないよう注意すること。
1139	フィコンバ細粒1%	ペランパネル水和物	めまい、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う操作に従事させないよう注意すること。
1139	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	フェンフルラミン塩酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、患者又は保護者等に対し、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事しないよう注意すること。
1139	ビムバットドライシロップ10%	ラコサミド	浮動性めまい、霧視、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1139	ビムバット錠100mg	ラコサミド	浮動性めまい、霧視、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1139	ラモトリギン錠100mg「トーワ」	ラモトリギン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1139	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	ラモトリギン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1139	ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」	ラモトリギン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1139	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」	ラモトリギン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1139	イノベロン錠100mg	ルフィナミド	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う操作に従事させないよう注意すること。
1139	イーケプラドライシロップ50%	レベチラセタム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1139	イーケプラ錠250mg	レベチラセタム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1139	イーケプラ錠500mg	レベチラセタム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1145	インテバン坐剤25(25mg)	インドメタシン	眠気、めまい、ふらつき感等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
1145	インフリーSカプセル200mg	インドメタシン ファルネシリ	眠気、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
1147	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
1147	ジクロフェナクNa徐放カセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
1147	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
1147	ボルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
1147	ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム	本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
1147	ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム	本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
1149	ツートラム錠25mg	トラマドール塩酸塩	眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。
1149	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。
1149	ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。
1149	ツートラム錠150mg	トラマドール塩酸塩	眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。
1149	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。
1149	トラマールOD錠50mg	トラマドール塩酸塩	眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。
1149	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。

薬効分類	採用商品名	一般名	添付文書記載内容
1149	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。
1149	ノレスパンテープ5mg	ブブレノルフイン	眠気、めまい、ふらつきが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1149	レペタン坐剤0.2mg	ブブレノルフイン塩酸塩	眠気、めまい、ふらつき、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1149	モーピック錠5mg	メロキシカム	眼の調節障害、眠気等の精神神経系症状があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
1149	ソセゴン錠25mg	塩酸ペンタゾシン	眠気、めまい、ふらつき等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
1160	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	ねむけ、眼の調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
1161	シンメトレル細粒10%	アマンタジン塩酸塩	めまい、ふらつき、立ちくらみ、霧視等があらわれることがあるので、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
1161	シンメトレル錠100mg	アマンタジン塩酸塩	めまい、ふらつき、立ちくらみ、霧視等があらわれることがあるので、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
1161	シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩	めまい、ふらつき、立ちくらみ、霧視等があらわれることがあるので、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
1162	アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩	眠気、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
1169	ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	前兆のない突然の睡眠、睡眠発作、起立性低血圧、傾眠、めまい、意識消失、失神等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転、機械の操作、高所作業等、危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
1169	エンタカボン錠100mg「トーウ」	エンタカボン	前兆のない突然の睡眠、傾眠、起立性低血圧があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転、高所での作業等、危険を伴う作業には従事させないように注意すること。
1169	オングエンティス錠25mg	オビカボン	前兆のない突然の睡眠、傾眠、起立性低血圧、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転、高所での作業等、危険を伴う作業には従事させないように注意すること。
1169	カバサール錠1.0mg	カベルゴリン	前兆のない突然の睡眠、傾眠、起立性低血圧がみられることがあるので、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
1169	カバサール錠0.25mg	カベルゴリン	前兆のない突然の睡眠、傾眠、起立性低血圧がみられることがあるので、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
1169	エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシリ酸塩	本剤投与により日中の傾眠、前兆のない突然の睡眠があらわれることがあるため、本剤投与中の患者には自動車の運転、機械の操作、高所での作業等、危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
1169	エフピーOD錠2.5(2.5mg)	セレギリン塩酸塩	めまい、注意力・集中力・反射機能等の低下が起こことがあるので、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
1169	ゾニサミドOD錠25mg	ゾニサミド	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1169	ゾニサミドOD錠50mg	ゾニサミド	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1169	パーロデル錠2.5mg	プロモクリプチニメシリ酸塩	著しい血圧下降、前兆のない突然の睡眠、傾眠があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
1169	ペルマックス錠250 μg	ペルゴリドメシリ酸塩	前兆のない突然の睡眠、傾眠がみられることがあるので、自動車の運転、高所での作業等、危険を伴う作業には従事させないように注意すること。
1169	ペルマックス錠50 μg	ペルゴリドメシリ酸塩	前兆のない突然の睡眠、傾眠がみられることがあるので、自動車の運転、高所での作業等、危険を伴う作業には従事させないように注意すること。
1169	アジレクト錠1mg	ラサギリンメシリ酸塩	日中の傾眠、前兆のない突然の睡眠又は睡眠発作があらわれることがあるため、本剤投与中の患者には自動車の運転、機械の操作、高所での作業等、危険を伴う作業には従事させないように注意すること。
1169	ヴィアレップ配合持続皮下注	レボドバ・カルビドバ水和物	前兆のない突然の睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
1169	デュオドーバ配合経腸用液	レボドバ・カルビドバ水和物	前兆のない突然の睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
1169	ドバコール配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物	前兆のない突然の睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
1169	ドバコール配合錠L50	レボドバ・カルビドバ水和物	前兆のない突然の睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
1169	スタレボ配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物・エンタカボン	前兆のない突然の睡眠、傾眠、起立性低血圧等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転、高所での作業等、危険を伴う作業には従事させないように注意すること。
1169	スタレボ配合錠L50	レボドバ・カルビドバ水和物・エンタカボン	前兆のない突然の睡眠、傾眠、起立性低血圧等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転、高所での作業等、危険を伴う作業には従事させないように注意すること。
1169	マドパー配合錠	レボドバ・ベンセラジド塩酸塩	前兆のない突然の睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
1170	トリプタノール錠10(10mg)	アミトリプチリン塩酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1170	トリプタノール錠25(25mg)	アミトリプチリン塩酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

薬効分類	採用商品名	一般名	添付文書記載内容
1179	クエチアピン錠25mg「明治」	クエチアピンフル酸塩	本剤は主として中枢神経系に作用するため、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	クエチアピン錠12.5mg「明治」	クエチアピンフル酸塩	本剤は主として中枢神経系に作用するため、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	ビプレツソ徐放錠150mg	クエチアピンフル酸塩	本剤は主として中枢神経系に作用するため、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	ビプレツソ徐放錠50mg	クエチアピンフル酸塩	本剤は主として中枢神経系に作用するため、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	クロザリル錠100mg	クロザピン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	クロザリル錠25mg	クロザピン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	リーゼ錠5mg	クロチアゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	ロドビン錠25mg	ゾテビン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	グラマリール錠25mg	チアブリド塩酸塩	眠気、めまい・ふらつき等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	トラゾドン塩酸塩錠25mg	トラゾドン塩酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	ノリトレン錠10mg	ノルトリップチリン塩酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	インヴェガ錠3mg	パリペリドン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	インヴェガ錠6mg	パリペリドン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	セレネース錠0.75mg	ハロペリドール	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	ハロペリドール錠1.5mg	ハロペリドール	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジンバモ酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械類の操作には従事させないように注意すること。
1179	ルボックス錠25(25mg)	フルボキサミンマレイン酸塩	眠気、意識レベルの低下・意識消失等の意識障害が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	ルボックス錠75(75mg)	フルボキサミンマレイン酸塩	眠気、意識レベルの低下・意識消失等の意識障害が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	レキサルティOD錠0.5mg	プレクスピラゾール	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	レキサルティOD錠1mg	プレクスピラゾール	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	レキサルティOD錠2mg	プレクスピラゾール	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	プロナンセリン錠4mg「DSPB」	プロナンセリン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	ロナセンテープ20mg	プロナンセリン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤使用中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	ロナセンテープ40mg	プロナンセリン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤使用中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	眠気、めまい等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意せること。また、患者に、これらの症状を自覚した場合は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、指導すること。
1179	トリンテリックス錠10mg	ポルチオキセチン	眠気、めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意せること。また、これらの症状を自覚した場合には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう患者に指導すること。
1179	ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩	めまい、眠気等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	ルジオミール錠25mg	マプロチリン塩酸塩	めまい、眠気等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないように注意すること。
1179	ミルタザピン錠15mg「トーワ」	ミルタザピン	眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1179	トレドミン錠15mg	ミルナシプラン塩酸塩	眠気、めまい等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意せること。また、患者に、これらの症状を自覚した場合は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、指導すること。

薬効分類	採用商品名	一般名	添付文書記載内容
1179	トレドミン錠25mg	ミルナシプラン塩酸塩	眠気、めまい等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。また、患者に、これらの症状を自覚した場合は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、指導すること。
1179	コンサーta錠18mg	メチルフェニデート塩酸塩	めまい、眼気、視覚障害等が発現するおそれがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。
1179	コンサーta錠27mg	メチルフェニデート塩酸塩	めまい、眼気、視覚障害等が発現するおそれがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。
1179	コンサーta錠36mg	メチルフェニデート塩酸塩	めまい、眼気、視覚障害等が発現するおそれがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。
1179	リタリン錠10mg	メチルフェニデート塩酸塩	めまい、眼気、視覚障害等が発現するおそれがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
1179	ビパンセカブセル20mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	めまい、眼気、視覚障害等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。
1179	ビパンセカブセル30mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	めまい、眼気、視覚障害等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。
1179	モディオダール錠100mg	モダフィニル	眠気の程度によっては本剤の服用によっても覚醒レベルが正常に復さない可能性があるので、日中の眠気等の臨床症状について観察を十分に行い、必要に応じて自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
1179	リスペリドンOD錠1mg	リスペリドン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1179	リスペリドンOD錠2mg	リスペリドン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1179	リスペリドン内用液1mg/mL	リスペリドン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1179	リスペリドン内用液1mg/mL 0.5mL包	リスペリドン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1179	リスペリドン内用液1mg/mL 1mL包	リスペリドン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1179	ラツーダ錠20mg	ルラシドン塩酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1179	炭酸リチウム錠200(200mg)	炭酸リチウム	めまい、ねむけ等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械類の操作に従事させないよう注意すること。
1180	PL配合顆粒(1g/包)	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
119	タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	めまい、傾眠、意識消失等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。特に高齢者ではこれらの症状により転倒し骨折等を起こすおそれがあるため、十分に注意すること。
119	タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	めまい、傾眠、意識消失等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。特に高齢者ではこれらの症状により転倒し骨折等を起こすおそれがあるため、十分に注意すること。
119	タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	めまい、傾眠、意識消失等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。特に高齢者ではこれらの症状により転倒し骨折等を起こすおそれがあるため、十分に注意すること。
119	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	めまい、傾眠、意識消失等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。特に高齢者ではこれらの症状により転倒し骨折等を起こすおそれがあるため、十分に注意すること。
1190	レグナイト錠300mg	ガバベンチン エナカルビル	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1190	ベルソムラ錠15mg	スポレキサント	本剤の影響が服用の翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1190	ベルソムラ錠20mg	スポレキサント	本剤の影響が服用の翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1190	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg 「NP」	ドネベジル塩酸塩	アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症では、自動車の運転等の機械操作能力が低下する可能性がある。また、本剤により、意識障害、めまい、眼気等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう患者等に十分に説明すること。
1190	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg 「NP」	ドネベジル塩酸塩	アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症では、自動車の運転等の機械操作能力が低下する可能性がある。また、本剤により、意識障害、めまい、眼気等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう患者等に十分に説明すること。
1190	ドネベジル塩酸塩OD錠10mg	ドネベジル塩酸塩	アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症では、自動車の運転等の機械操作能力が低下する可能性がある。また、本剤により、意識障害、めまい、眼気等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう患者等に十分に説明すること。
1190	アリドネバッヂ27.5mg	ドネベジル	アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症では、自動車の運転等の機械操作能力が低下する可能性がある。また、本剤により、意識障害、めまい、眼気等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう患者等に十分に説明すること。
1190	ナルフラフィンOD錠2.5μg 「フロー」	ナルフラフィン塩酸塩	眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。
1190	ミオカーム内服液33.3%	ピラセタム	眠気、抑うつ、運動過剰等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1190	ジスパルカブセル40mg	バルベナジントシル酸塩	傾眠、鎮静等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

薬効分類	採用商品名	一般名	添付文書記載内容
1190	プレガバリンOD錠150mg「トーワ」	プレガバリン	本剤の投与によりめまい、傾眠、意識消失等があらわれ、自動車事故に至った例もあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。特に高齢者ではこれらの症状により転倒し骨折等を起こした例があるため、十分に注意すること。
1190	プレガバリンOD錠25mg「トーワ」	プレガバリン	本剤の投与によりめまい、傾眠、意識消失等があらわれ、自動車事故に至った例もあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。特に高齢者ではこれらの症状により転倒し骨折等を起こした例があるため、十分に注意すること。
1190	プレガバリンOD錠75mg「トーワ」	プレガバリン	本剤の投与によりめまい、傾眠、意識消失等があらわれ、自動車事故に至った例もあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。特に高齢者ではこれらの症状により転倒し骨折等を起こした例があるため、十分に注意すること。
1190	サノレックス錠0.5mg	マジンドール	本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1190	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	メマンチン塩酸塩	通常、中等度及び高度アルツハイマー型認知症では、自動車の運転等危険を伴う機械の操作能力が低下することがある。また、本剤により、めまい、傾眠等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1190	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	通常、中等度及び高度アルツハイマー型認知症では、自動車の運転等危険を伴う機械の操作能力が低下することがある。また、本剤により、めまい、傾眠等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1190	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	通常、中等度及び高度アルツハイマー型認知症では、自動車の運転等危険を伴う機械の操作能力が低下することがある。また、本剤により、めまい、傾眠等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1190	メラトペル顆粒小児用0.2%	メラトニン	眠気、めまい等があらわれることがあるので、患者又は保護者等に対し、機械操作などを行う際には十分に注意を与えること。ただし、危険を伴う機械操作に従事する高齢の小児に対しては、本剤投与中には当該操作を行わないように十分に注意を与えること。
1190	ラメルテオൺ錠8mg「武田テバ」	ラメルテオն	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1190	リバスタッヂパッチ13.5mg	リバストグミン	アルツハイマー型認知症は、自動車の運転等の機械操作能力を低下させる可能性がある。また、本剤は主に投与開始時又は増量時にめまい及び傾眠を誘発することがある。このため、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1190	リバスタッヂパッチ18mg	リバストグミン	アルツハイマー型認知症は、自動車の運転等の機械操作能力を低下させる可能性がある。また、本剤は主に投与開始時又は増量時にめまい及び傾眠を誘発することがある。このため、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1190	リバスタッヂパッチ4.5mg	リバストグミン	アルツハイマー型認知症は、自動車の運転等の機械操作能力を低下させる可能性がある。また、本剤は主に投与開始時又は増量時にめまい及び傾眠を誘発することがある。このため、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1190	リバスタッヂパッチ9mg	リバストグミン	アルツハイマー型認知症は、自動車の運転等の機械操作能力を低下させる可能性がある。また、本剤は主に投与開始時又は増量時にめまい及び傾眠を誘発することがある。このため、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1190	リルゾール錠50mg「ニプロ」	リルゾール	本剤の投与中に、めまい又は眠気が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
1190	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	本剤の影響が服用の翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1190	デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	本剤の影響が服用の翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1190	レイボー錠50mg	ラスマジタンコハク酸塩	本剤投与により眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう十分注意すること。
1190	レイボー錠100mg	ラスマジタンコハク酸塩	本剤投与により眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう十分注意すること。
1229	ダントリウムガベセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1231	プロ・パンサイン錠15mg	プロパンテリン臭化物	眼の調節障害、眠気を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
1242	ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	眼の調節障害等を起こすがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1249	アロフト錠20mg	アフロケアロン	反射運動能力の低下、眠気等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1249	ミオナール錠50mg	エペリゾン塩酸塩	本剤投与中に脱力感、ふらつき、眠気等が発現することがあるので、その場合には減量又は休薬すること。なお、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
1249	テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩	反射運動能力の低下、眠気、めまい及び低血圧等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
1249	リオレーサール錠5mg	バクロフェン	眠気等を催すがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
1311	日点アトロビン点眼液1%(5mL)	アトロビン硫酸塩水和物	散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。また、サングラスを着用する等太陽光や強い光を直接見ないように指導すること。
1311	ミドリソルM点眼液0.4%(5mL)	トロピカミド	散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。また、サングラスを着用する等太陽光や強い光を直接見ないように指導すること。
1311	ネオシネジンコーカジン点眼液(10mL)	フェニレフリン塩酸塩	本剤を投与した患者には散瞳が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。また、サングラスを着用するなど太陽光や強い光を直接見ないように注意すること。
1312	サンビロ点眼液2%(5mL)	ビロカルビン塩酸塩	縮瞳(暗黒感)又は調節痙攣が起こるので、本剤投与中の患者には、縮瞳(暗黒感)又は調節痙攣が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
1319	エイベリス点眼液0.002%(2.5mL)	オミデネバゲ イソプロピル	本剤の点眼後、一時的に霧視、羞明等があらわれることがあるため、その症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないように注意すること。

薬効分類	採用商品名	一般名	添付文書記載内容
1319	ミケルナ配合点眼液(2.5mL)	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないよう注意すること。
1319	タプロミニ点眼液 0.0015%(0.3mL)	タフルプロスト	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、その症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないよう注意すること。
1319	タプロ点眼液0.0015%(2.5mL)	タフルプロスト	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、その症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないよう注意すること。
1319	タブコム配合点眼液(2.5mL)	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、その症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないよう注意すること。
1319	トラバタス点眼液 0.004%(2.5mL)	トラボプロスト	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないよう注意すること。
1319	サンドールP点眼液(5mL)	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。また、サングラスを着用する等太陽光や強い光を直接見ないよう指導すること。
1319	ルミガン点眼液0.03%(2.5mL)	ビマトプロスト	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないよう指導すること。
1319	ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」(2.5mL)	ラタノプロスト	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないよう注意すること。
1319	ザラカム配合点眼液(2.5mL)	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないよう注意すること。
1329	ザジテン点鼻液0.05%(8mL)	ケトチフェンフル酸塩	眠気を催すがあるので、本剤使用中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。
1329	リボスチン点鼻液0.025mg ¹¹² 噴霧用	レボカバステチン塩酸塩	眠気を催すがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分指導すること。
1339	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン	眠気を催すがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
2129	シベノール錠100mg	シベンゾリジンコハク酸塩	めまい、ふらつき、低血糖があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
2129	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	メキシレチン塩酸塩	頭がボートする、めまい、しびれ等の精神神経系症状が発現し、増悪する傾向がある場合には、直ちに減量又は投与を中止すること。また、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
2129	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	メキシレチン塩酸塩	頭がボートする、めまい、しびれ等の精神神経系症状が発現し、増悪する傾向がある場合には、直ちに減量又は投与を中止すること。また、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
2139	サムスカOD錠15mg	トルバブタン	(常染色体優性多発性のう胞腎の場合)失神、意識消失、めまい等があらわれることがあるので、転倒に注意すること。また、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
2139	サムスカOD錠7.5mg	トルバブタン	(常染色体優性多発性のう胞腎の場合)失神、意識消失、めまい等があらわれることがあるので、転倒に注意すること。また、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
2139	サムスカ顆粒1%	トルバブタン	(常染色体優性多発性のう胞腎の場合)失神、意識消失、めまい等があらわれることがあるので、転倒に注意すること。また、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
2149	ミケランLAカプセル15mg	カルテオロール塩酸塩	めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者(特に投与初期)には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
2149	カルベジロール錠 1.25mg「サワイ」	カルベジロール	めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者(特に投与初期や增量時)には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業をしないように注意させること。
2149	カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」	カルベジロール	めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者(特に投与初期や增量時)には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業をしないように注意させること。
2149	カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール	めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者(特に投与初期や增量時)には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業をしないように注意させること。
2160	レルバックス錠20mg	エレトリフタン臭化水素酸塩	片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないように十分注意すること。
2160	イミグランキット皮下注3mg	スマトリプタンコハク酸塩	片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないよう十分注意すること。
2160	イミグラン点鼻液20(20mg)	スマトリプタン	片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないように十分注意すること。
2160	イミグラン錠50(50mg)	スマトリプタンコハク酸塩	片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないように十分注意すること。
2160	ゾーミックRM錠2.5mg	ゾルミトリブタン	片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないように十分注意すること。
2160	アマージ錠2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩	片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないように十分注意すること。
2160	マクサルトRPD錠10mg	リザトリブタン安息香酸塩	片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないように十分注意すること。
2171	ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン	また、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
2171	ニトロベン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用が起こりやすく、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
2171	ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用が起こりやすく、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

薬効分類	採用商品名	一般名	添付文書記載内容
2171	アイトロール錠20mg	一硝酸イソルビド	また、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
2171	ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソルビド	また、これらの副作用のために注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
2171	フランドルテープ40mg	硝酸イソルビド	また、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
2190	コララン錠2.5mg	イバプラジン	光視症、霧視、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作をする際には患者に十分注意されること。また、これらの症状が認められた場合は、自動車の運転等危険を伴う操作に従事しないよう指導すること。
2190	コララン錠5mg	イバプラジン	光視症、霧視、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作をする際には患者に十分注意されること。また、これらの症状が認められた場合は、自動車の運転等危険を伴う操作に従事しないよう指導すること。
2190	コララン錠7.5mg	イバプラジン	光視症、霧視、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作をする際には患者に十分注意されること。また、これらの症状が認められた場合は、自動車の運転等危険を伴う操作に従事しないよう指導すること。
2190	ミグシス錠5mg	塩酸ロメリジン	眠気等を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。
2223	デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10%	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	眼気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
2223	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	眼気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
2242	コデインリン酸塩散1%	コデインリン酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
2319	ロペミン小兒用細粒0.05%	塩酸ロペラミド	眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
2319	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	塩酸ロペラミド	眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
2329	ドグマチール錠50mg	スルビリド	ときには眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
2399	メクロプラミド錠5mg「NIG」	メクロプラミド	眠気、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
2459	セレスタン配合錠	ベタメタゾン・d-ケロルフェニラミンマレイン酸塩	眼気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。
2490	サムスカOD錠30mg	トルバブタン	失神、意識消失、めまい等があらわれることがあるので、転倒に注意すること。また、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
2499	クロミッド錠50mg	クロミフェンクエン酸塩	霧視等の視覚症状があらわれることがあるので、服用中は自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
2590	バップフォー錠10(10mg)	プロピペリン塩酸塩	眼調節障害、眠気、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
3939	ノックピン原末	ジスルフィラム	眼気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
3999	ビルフェニドン錠200mg「日医工」	ビルフェニドン	眠気、めまい、ふらつきが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
4291	アロマシン錠25mg	エキセメスタン	本剤の使用による嗜眠、傾眠、無力(症)及びめまいが報告されており、このような症状がある場合、機械操作や自動車の運転はさせないように十分注意すること。
4291	サレドカプセル100(100mg)	サリドマイド	傾眠、眠気、めまい、徐脈、起立性低血圧が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
4291	サレドカプセル50(50mg)	サリドマイド	傾眠、眠気、めまい、徐脈、起立性低血圧が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
4291	タシグナカカプセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	めまい、霧視・視力低下等の視力障害等があらわれることがあるので、このような場合には、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
4291	タシグナカカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	めまい、霧視・視力低下等の視力障害等があらわれることがあるので、このような場合には、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
4291	ファリーダックカプセル10mg	パノビノスタット乳酸塩	本剤投与により、低血圧、起立性低血圧、失神、意識消失があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
4291	ファリーダックカプセル15mg	パノビノスタット乳酸塩	本剤投与により、低血圧、起立性低血圧、失神、意識消失があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
4291	ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ水和物	浮動性めまい、疲労、視力障害等があらわれることがあるので、このような場合には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意せること。
4291	ボマリストカプセル1mg	ボマリドミド	外国臨床試験において、傾眠、錯乱、疲労、意識レベルの低下、めまいが報告されているので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作を避けるよう注意すること。
4291	ボマリストカプセル2mg	ボマリドミド	外国臨床試験において、傾眠、錯乱、疲労、意識レベルの低下、めまいが報告されているので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作を避けるよう注意すること。
4291	ボマリストカプセル3mg	ボマリドミド	外国臨床試験において、傾眠、錯乱、疲労、意識レベルの低下、めまいが報告されているので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作を避けるよう注意すること。
4291	ボマリストカプセル4mg	ボマリドミド	外国臨床試験において、傾眠、錯乱、疲労、意識レベルの低下、めまいが報告されているので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作を避けるよう注意すること。
4291	レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	海外臨床試験において、疲労、めまい、傾眠、霧視、錯乱が報告されているので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作を避けるよう注意すること。
4411	レスタミンコーウ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	眼気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。

薬効分類	採用商品名	一般名	添付文書記載内容
4413	ビレチア錠(25mg)	プロメタジン塩酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
4413	ニボラジン錠3mg	メキタジン	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作には従事させないように十分注意すること。
4419	ボララミン錠2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
4419	ベリアクチンシロップ0.04%	シプロヘブタジン塩酸塩水和物	眠気を催すことがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
4419	ベリアクチン散1%	シプロヘブタジン塩酸塩水和物	眠気を催すことがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
4419	ベリアクチン錠4mg	シプロヘブタジン塩酸塩水和物	眠気を催すことがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
4490	アゼブチン錠1mg	アゼラスチン塩酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
4490	アレサガテーブ4mg	エメダステンフル酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤使用中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。更に、日常生活に支障がみられる場合があるので、本剤使用に際してはこのことを患者に十分説明しておくこと。
4490	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	オロパタジン塩酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
4490	オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%	オロパタジン塩酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
4490	ザジテンカプセル1mg	ケトチフェンフル酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
4490	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェンフル酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
4490	シルテックドライシロップ1.25%	セチリジン塩酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
4490	ジルテック錠10(10mg)	セチリジン塩酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
4490	ルバフィン錠10mg	ルバタジンフル酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
4490	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
4490	ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
6152	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	めまい感があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作及び高所での作業等に従事させないように注意すること。
6152	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」	ミノサイクリン塩酸塩	めまい感があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作及び高所での作業等に従事させないように注意すること。
6241	アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン塩酸塩	失神、意識消失、めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。投与にあたっては、これらの副作用が発現する場合があることを患者等に十分に説明すること。
6250	ハリキサドライシロップ5000mg	バルガニシクロビル塩酸塩	本剤及び本剤の活性代謝物であるガンシクロビルの投与により痙攣、鎮静、めまい、運動失調、錯乱が報告されているので、本剤投与中の患者には自動車の運転、危険を伴う機械の操作等に従事させないこと。
6250	バリキサ錠450mg	バルガニシクロビル塩酸塩	本剤及び本剤の活性代謝物であるガンシクロビルの投与により痙攣、鎮静、めまい、運動失調、錯乱が報告されているので、本剤投与中の患者には自動車の運転、危険を伴う機械の操作等に従事させないこと。
7990	チャンピックス錠0.5mg	パレニクリン酒石酸塩	めまい、傾眠、意識障害等があらわれ、自動車事故に至った例も報告されているので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
7990	チャンピックス錠1mg	パレニクリン酒石酸塩	めまい、傾眠、意識障害等があらわれ、自動車事故に至った例も報告されているので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8113	アヘンチンキ	アヘンチンキ	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8114	アンベック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8114	オブソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8114	モルヒネ塩酸塩錠10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8114	モルヒネ塩酸塩注射液10mg(1mL)「ジオノキ」	モルヒネ塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8114	モルヒネ塩酸塩注射液50mg(5mL)	モルヒネ塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8114	MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8114	MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8114	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	モルヒネ硫酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8115	コデインリン酸塩水和物原末	コデインリン酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8115	コデインリン酸塩錠20mg	コデインリン酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8119	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8119	オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8119	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

薬効分類	採用商品名	一般名	添付文書記載内容
8119	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
8119	オキシコンチンTR錠 5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8119	オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8119	オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8119	オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8119	オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8119	オキノーム散20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8119	オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8119	ナルサス錠2mg	ヒドロモルファン塩酸塩	眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8119	ナルサス錠6mg	ヒドロモルファン塩酸塩	眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8119	ナルベイン注2mg	ヒドロモルファン塩酸塩	眠気、めまいが起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8119	ナルラビド錠1mg	ヒドロモルファン塩酸塩	眠気、めまいが起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8219	タベンタ錠 100mg	タベンタドール塩酸塩	眠気、めまいが起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。特に本剤投与開始時及び用量変更時、並びに飲酒時及び鎮静剤等の併用時には、これらの副作用が増強されるおそれがあるため注意すること。
8219	タベンタ錠 25mg	タベンタドール塩酸塩	眠気、めまいが起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。特に本剤投与開始時及び用量変更時、並びに飲酒時及び鎮静剤等の併用時には、これらの副作用が増強されるおそれがあるため注意すること。
8219	デュロテップMT パッチ2.1mg	フェンタニル	眠気、めまいが起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8219	デュロテップMT パッチ4.2mg	フェンタニル	眠気、めまいが起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8219	アブストラル舌下錠100 μ g	フェンタニルレクエン酸塩	眠気、めまいが起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8219	フェンタニル注射液0.1mg (2mL)	フェンタニルレクエン酸塩	本剤の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
8219	フェンタニル注射液0.25mg (5mL)	フェンタニルレクエン酸塩	本剤の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
8219	フェントステープ0.5mg	フェンタニルレクエン酸塩	眠気、めまいが起こことがあるので、本剤使用中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8219	フェントステープ1mg	フェンタニルレクエン酸塩	眠気、めまいが起こことがあるので、本剤使用中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8219	フェントステープ2mg	フェンタニルレクエン酸塩	眠気、めまいが起こことがあるので、本剤使用中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8219	フェントステープ4mg	フェンタニルレクエン酸塩	眠気、めまいが起こことがあるので、本剤使用中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
8219	メサペイン錠5mg	メサドン塩酸塩	眠気、めまいが起こことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。